

Varroa Sommerbehandlung auf der Basis /Ameisensäure mit den Maq Streifen?



Unsere Bienen





MAQS[®] Streifen

- Weisslich bis caramelfarbener rechteckiger Streifen, eingewickelt in einem beschichteten Papier
- 68.2 g Ameisensäure / Streifen






- Anwendungsfertig – Kein hantieren mit flüssiger Säure
- Nachgewiesene hohe Wirksamkeit
- Trifft Varroa im Brutstadium
- Keine Resistenzen beobachtet
- Keine Rückstände im Honig und im Wachs
- Gesunde Bienen geben höheren Honigertrag
- Anerkanntes Tierarzneimittel

Von Mai bis Juni

- Drohnenschneiden
- Verdeckelte Brutwaben entnehmen
- damit Varroadruck senken
- Jungvölker bilden und den Schwarmtrieb steuern

So nicht ??



Sommerbehandlung mit Maq

- So früh wie möglich nach erster Fütterung
- Temperatur unter 30° C
- Fluglöcher eingeengt (Räubereigefahr)
- Gitterboden offen
- 1. Streifen einlegen
- Nach 10 Tagen Volk auffüttern

Herbstbehandlung

- 15 September?!
- Temperatur beachten 12 - 25° C
- Schweizerkasten 1. Streifen
- Grosse Magazine 2 Streifen
- 2 zargige Magazine Streifen immer oben

Behandlung bei einem starken Magazinvolk im Herbst



Nach erfolgter Behandlung



Vorsichtsmassnahmen!

- Säurefeste Handschuhe tragen
- Wasser griffbereit
- Schere zum aufschneiden der Plastikfolie



1. Schmalseite
aufschneiden

2. Längsnaht
anheben

3. Beutel der Länge
nach
aufschneiden

4. Streifen mit
Stockmeißel
voneinander
trennen



Vorteile mit der MAQs Behandlung:

- Einfache, schnelle Anwendung
- Anwendersicherheit im Umgang mit Säure
- Kein Dispenser notwendig
- Weniger Fehleranfällig?
- Zeitersparnis

Nachteile:

- Materialkosten höher als bei Dispenser
- Bestellung 8 Monate vor Anwendung
- Haltbarkeit begrenzt

B
r
u
t
t
u
r
m

